



***Hebeloma velutipes* Bruchet, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 39(6(Suppl.)): 127 (1970)**

Píleo de hasta 70 mm de diámetro, primero convexo, más tarde plano convexo a extendido, pero ligeramente umbonado; margen más o menos velutinoso, enrollado en los carpóforos inmaduros, pero pronto recto. Superficie piléica suavemente viscosa en tiempo húmedo, no higrófono; de color blanquecino o crema blanquecino, crema rosado sobre todo al centro, en algunos casos más oscuro en tonos arcilla rosado, especialmente en el disco. **Láminas** apretadas, anchas, adnatas e emarginadas, a veces decurrentes por un diente, arista blanquecina, entera o un poco fimbriada; de color primero blanquecino, pronto ocre-arcilla, ocre marrón en la madurez. **Estípite** de hasta 80 x 15 mm, cilíndrico ensanchado hacia la base, primero lleno, hueco en la madurez, velutinoso en la parte superior, fibriloso en el resto; de color blanquecino, crema ocre hacia la base y en la madurez; cortina ausente. **Contexto** firme, blanquecino, ocráceo hacia la base del estípite en la madurez; olor rabanoide al corte, sabor rabanoide, ligeramente amargo. **Basidiósporas** (a) de 9,0-13,5 x 5,5-7,5 μm / Q = 1,6-2,0; amigdaliformes, ornamentación no observada; amarillo marrón en agua. Esporada marrón ocre. Basidios de hasta 35 x 9 μm , tetraspóricos, juntas con fíbulas. **Queilocistidios** (b) de hasta 90 x 12 μm , más o menos cilíndricos a subclavados, algo ensanchados en la base, a menudo ahorquillados. **Pileipellis** formada por un ixocutis de hasta 200 μm de espesor, con hifas entremezcladas, con elementos hasta x7 μm , hialinas, cutis amarillento, juntas con fíbulas. **Háb.:** bajo frondosas (*Populus*, *Fagus*, *Betula*, *Salix*, *Quercus*), más raramente bajo coníferas (*Pinus*, *Picea*, *Abies*), en verano y otoño. **Distr.:** poco común. **Foto:** 08/20/2016; Ubidea (Bizkaia); 750m, bajo *Picea abies*, en zona muy húmeda con musgo BAR2016100839. (Autor: José A. Muñoz Sánchez).

