



***Clitocybe fragrans* (With.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 121 (1871)**

Pileo de hasta 40mm de diámetro, primero plano convexo, pronto aplanado y un poco infundibuliforme; margen enrollado al principio, puede estar estriado por transparencia. Superficie higrófana, lisa; de color, en tiempo húmedo, pardo marrón, pardo rojizo o pardo grisáceo en el centro y más pálido hacia el margen, en tiempo seco palidece hasta el blanquecino pero con el centro algo más oscuro. **Láminas** más o menos apretadas, de adnatas a decurrentes; de color crema blanquecino. **Estipite** de hasta 65 x 6mm, cilíndrico, liso; del color del pileo pero algo más claro. **Contexto** higrófano, concolor al pileo; Olor fuerte anisado, sabor poco destacable. **Basidiósporas** (a) de 6,5-8,5 x 3,5-5,5 μm / Q= 1,5-1,9; elipsoides, lisas, hialinas, cianófilas. Esporada blanquecina. **Basidios** (b) de hasta 30 x 7 μm , claviformes, tetraspóricos, juntas con fíbulas. **Queilocistidios** ausentes. **Pileipellis** formada por un cutis de hifas paralelas o más o menos entremezcladas, hasta x7 μm , con pigmento intracelular, juntas con fíbulas. **Hab.:** en verano y otoño en bosques de coníferas y de frondosas. **Distr.:** poco común. Foto: 02/12/2016; Ubidea (Bizkaia), 750m, bajo *Picea abies*. BAR2016120204. (Autor: José A. Muñoz Sánchez).

