



***Limacella delicata* (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl., Revisione Hymenomycetes de France (1930)**

[= *Limacella vinosorubescens* Furrer-Ziogas, Schweiz. Z. Pilzk. 47: 214 (1969)]

[= *Limacella delicata* var. *vinosorubescens* (Furrer-Ziogas) Gminder, in Gminder, Z. Mykol. 80(2): 647 (2014)]

Pileo de hasta 80 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, finalmente extendido más o menos ondulado y ligeramente umbonado, margen inflexo, agudo, adornado de restos de velo floccosos en los ejemplares jóvenes, superficie piléica viscosa y brillante en estado húmedo, mate en estado seco, afieltrado o finamente escamoso, de color vinoso, marrón vinoso o rosado vinoso. **Láminas** apretadas, anchas, libres, de color primero crema blanquecino, se manchan progresivamente de rosa vinoso, arista entera, primero concolor después rosada. **Estípite** de hasta 70 x 15 mm, cilíndrico o claviforme, primero lleno, hueco en la madurez, superficie lisa, mate, blanquecina a rosada por encima de la zona anular, que puede exudar finas gotas en los carpóforos jóvenes, por debajo del velo con abundantes fibrillas longitudinales rosadas, zona anular blanquecina, fibrillosa y membranosa. **Contexto** poco firme, rosada al corte, sin olor ni sabor apreciable. **Basidiósporas** (a) de 3,5-5,0 x 3,0-4,0 µm / Q = 1,0-1,1, subesféricas, lisas, hialinas, gutuladas. Esporada crema blanquecino. **Basidios** de hasta 25 x 7 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fibulas. **Cistidios** no observados. **Pileipellis** formada por un ixotrichoderma, de elementos levantados, cilíndricos, hialinos, de hasta 50 x 4 µm, pigmentadas de marrón, juntas con fibulas. **Háb.**: en bosques de frondosas (*Fagus* y *Quercus*) o bosques mixtos con coníferas. **Distr.**: muy raro. Foto: 21-X-2016, Orozko (Bizkaia), 370m, con *Quercus robur* y *Pinus radiata*. BAR2016102112. (Autor: José A. Muñoz Sánchez).

