




***Arrhenia griseopallida* (Desm.) Watling, Notes Roy. Bot. Gdn. Edinb., 45 (3): 553, 1989**

≡ *Omphalina griseopallida* (Desm.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 44 (1886)]

**Caracteres macroscópicos.** Píleo de hasta 35mm de diámetro, primero plano-convexo, pronto aplanado y profundamente embudado; margen sinuoso-ondulado festoneado, con impresiones radiales traslúcidas que recorren desde el margen por las láminas; de color pardo oscuro a pardo negro en tiempo húmedo, pardo grisáceo en estado seco. Láminas gruesas, espaciadas, intervenadas, muy decurrentes, con presencia de lamélulas de tamaño variable; de color pardo marrón a pardo grisáceo. Estípite de hasta 20 x 5 mm, corto, cilíndrico, liso, de color del píleo. Contexto marrón, sin olor ni sabor particular.

**Caracteres microscópicos.** Basidiósporas de 8,5 - 14,0 x 5,5 – 7,5 µm / Q = 1,8 - 2,2; lisas, elipsoidales y un poco larmiformes, esporada de color blanco. Bucles presentes en las juntas de hifas.

**Ecología.** En claros de bosque y bordes de camino, en zonas musgosas. **Distribución.** Poco frecuente. Material estudiado. ARABA, Zigoitia, Azerogana, 890m, en un prado con musgo, en suelo calcáreo, 21-V-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR 2016052105. **Fotografía.** Jose A. Muñoz Sánchez.



*Arrhenia griseopallida* (Desm.) Watling, BAR2016052105, a. Basidiósporas, b. Basidios.