




***Botryobasidium medium* J. Erikss.**, Symb. bot. upsal. 16(no. 1): 54.1958

Caracteres macroscópicos. Fructificación resupinada, de varios centímetros de longitud, formando una capa o película muy delgada, de aspecto membranoso y arañoso; de color blanquecino, gris blanquecino, gris ceniza claro a amarillento pálido.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 9,0-12 x 5-6 μ m / Q = 2,2-2,7; naviculares a ligeramente elipsoidales, obtusas en la parte alta, lisas, hialinas. Basidios con 6 esterigmas, con bucles en la base, cilíndricos y cortos, 14-25 x 8-10 μ m. Sistema de hifas monomítico: Hifas de paredes delgadas, septadas, con bucles, de hasta x10 μ m; hifas subhimeniales hialinas, de paredes delgadas, de hasta x5 μ m.

Ecología. Sobre madera muerta de coníferas y de frondosas, de primavera a otoño. *Distribución.* Poco frecuente. *Material estudiado.* BIZKAIA, Orozko, 550m, sobre tronco muerto y descortezado de *Pinus radiata*, 23-IX-2016, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR2016092306. *Fotografía.* José A. Muñoz Sánchez.



Botryobasidium medium J. Erikss., BAR2016092306. a. Basidiósporas, b. Basidios, c. Sistema de Hifas.

