



Clavulinopsis fusiformis (Fr.) Corner, Ann. Bot. Mem., 1:367. 1950


≡ *Clavaria fusiformis* Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. (London) 2(no. 18): tab. 234. 1799

≡ *Ramariopsis fusiformis* (Sowerby) R.H. Petersen, Mycologia 70(3): 668. 1978

Caracteres macroscópicos. Fructificación de hasta 10 0mm de altura y hasta 6mm de anchura, fusiforme o en forma de huso, algo aplastados, con la terminación en punta y no ramificada, unidos por la base hasta 20 carpóforos. Superficie fértil, lisa, mate, de color amarillo naranja o amarillo dorado. Contexto firme, crujiente al romper; olor débil y sabor un poco amargo.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 5-7 x 4,5-6 μm / Q = 1,1-1,3; redondeadas, lisas, hialinas. Sistema de hifas monomítico: hifas hasta x7 μm , con paredes delgadas, juntas con fibulas.

Ecología. En verano y otoño en zonas húmedas y musgosas de prados y claros de bosque. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zeanuri, 750m, con *Chamaencyparis lawsoniana*, en claro de bosque con briofitos, 24-IX-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016092415. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Clavulinopsis fusiformis (Fr.) Corner, BAR2016092415. a. Basidiósporas, b. Basidios. Escala barra = 10 μm .