




## **Agaricus pampeanus Speg., Fungi Argentini pugillus 9:280. 1880**

≡ *Psalliota pampeana* (Speg.) Henn. In Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 1 (1): 240. 1898

**Caracteres macroscópicos.** Píleo hasta 150 mm de diámetro, primero globoso, después plano convexo finalmente aplanado e incluso algo deprimido al centro. Superficie seca, muy escamosa, craquelado en el centro y con grandes escamas triangulares imbricadas; de color blanquecino, ocráceo al frotar. Láminas apretadas, libres, primero rosa pálido, después rosa más vivo, y marrón negro al final. Estípite de hasta 80 x 30mm, corto, cilíndrico, blanco, liso por encima del anillo y con finos restos floconosos por debajo de este; anillo súpero, grueso, variable, con el borde en general dentado. Contexto firme, blanco, amarillo pálido hacia la base del estípite, algo rosado al frotar en la zona de las láminas; olor y sabor débil o poco apreciable.

**Caracteres microscópicos.** Basidiósporas de 7,5-10,0 x 5,5-7,5  $\mu\text{m}$  / Q = 1,2-1,5; elipsoidales, marrones. Queilicistidios escasos, de hasta 35 x 20  $\mu\text{m}$ , claviformes, en su mayoría simples.

**Ecología.** En primavera y otoño, formando corros de brujas en prados, pastizales y páramos, desde el llano a la montaña. Distribución. Poco frecuente. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, Pago-makurre, 1120m, en un prado calcáreo, 24-V-2014, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2014052405, Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



*Agaricus pampeanus* Speg., BAR2014052405, a. Basidiósporas, b. Queilicistidios. Escala barra = 10  $\mu\text{m}$ .