




***Cortinarius balteatoalbus* Rob. Henry, Bull. Soc- Mycol. Fr., 74 : 305. 1958**

Caracteres macroscópicos. Pileo de hasta 70 mm de diámetro, primero globoso, después convexo a extendido; margen incurvado, grueso. Superficie piléica separable, poco viscosa, pronto seca, sin fibrillas innatas, dulce; de color blanquecino, blanco-crema, ocre en la madurez. Láminas medianamente apretadas, desiguales, con numerosas lamélulas, estrechas, adnatas, arista aserrada; de color blanco, después cremas. Estípite hasta 60x20 mm, claviforme-bulboso, pero no marginado, lleno, fibrilloso; de color blanco o blanquecino; cortina fugaz, blanquecina. Contexto espeso, firme, blanquecino, un poco rosada hacia el estípite; con olor débil harinoso y sabor dulce.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 8,0-10,5 x 4,0-5,5 μm / Q = 1,6-2,0; amigdaliformes, apiculadas, con verrugas bajas y poco densas, amarillo-leonado claro con KOH al 2%. Esporada pardo-ferruginosa. Pileipellis filamentosa, gelificada, con hifas de hasta x6 μm , cilíndricas, tumbadas septadas, juntas fibuladas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de coníferas (*Pinus sp.*) de montaña, en suelos ligeramente ácidos. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** MADRID, Bustarviejo, 1250m, con *Pinus sylvestris*, en suelo ácido, 7-XI-2013, leg. J.A. Muñoz, det. J.A. Cadiñanos, BAR2013110770. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius balteatoalbus Rob. Henry, BAR2013110770, a. Basidiósporas.

