




***Crepidotus applanatus* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk., 74. 1871**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 60 mm de diámetro, primero sésil, después semicircular, flabeliforme o reniforme, finalmente plano-convexo; margen curvado, después derecho. Superficie piléica, higrófana, brillante en tiempo húmedo, afieltrada o vellosa; de color blanco, blanquecino, gris-claro, finalmente crema. Láminas bastante apretadas, estrechas, adnatas; de color primero blanquecinas, después ocre y finalmente marrones. Esporada marrón-rosada. Estípites ausente o muy rudimentario, blanco y vellosos. Contexto de consistencia frágil; de color crema; sin olor ni sabor particular.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 5,0-6,5 x 5,0-6,0 / Q = 1,0-1,1; globosas o sub-globulosas, con contenido granuloso, con verrugas finas y moderadamente densas. Queilocistidios hasta 60 x 12 µm; claviformes o capitados, juntas con fíbulas. Pileipellis formada por una trichoderma de hifas más o menos entremezcladas, con los artículos finales un poco levantados, hasta x12 µm, lisas, cilíndricas, los elementos terminales a modo de pileocistidios, juntas sin fíbulas, finamente incrustados.

Ecología. En verano y otoño sobre troncos muertos de frondosas. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BIZKAIA, Orozko, 570m, sobre madera muy degradada de *Fagus sylvatica*, 28/08/2013, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2013082812. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm., BAR2013082812, a. Basidiósporas, b. Queilocistidios.

