



***Ditiola peziziformis* (Lév.) D.A. Reid, Trans. Br. Mycol. Soc., 62 (3) : 474. 1974**

≡ *Exidia peziziformis* Lév., Annales des Sciences Naturelles Botanique 9: 127. 1848 [basiónimo]


≡ *Femsjonia peziziformis* (Lév.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 25: 352. 1876

= *Femsjonia luteoalba* Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 341. 1849

Caracteres macroscópicos. Fructificación cespitoso, hasta 10 mm de diámetro, turbinado o cupuliforme, en forma de disco aplanado o un poco cóncavo; cara interna de color amarillo vivo, amarillo de huevo, amarillo-naranja; cara exterior blanquecina, finamente floconosa. Contexto gelatinoso, blando, traslúcido.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 20-25 x 8-10 µm / Q = 2,1-3,0; cilíndricas a elípticas, un poco alantoides, lisas, hialinas, con contenido granuloso. Basidios hasta 100 x 6 µm, en forma de diapasón, bispóricos. Sin cistidios. Hifas hasta x 8 µm, septadas, hinchadas en los septos, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño sobre madera muerta de frondosas y de coníferas. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BI-ZKAIA, Trapagaran, 520m, sobre madera descortezada de *Pinus radiata*, 16/09/2012, leg. & det. J.A. Muñoz. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez).



Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid, a. Basidiósporas, b. Basidios.