




***Entoloma conferendum* (Britzelm.) Noordel., Persoonia 10(4): 446. 1980**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 60 mm de diámetro, primero cónico, hemisférico o campanulado después extendido a plano convexo, con un pequeño umbón central, margen un poco involuto, después recto, higrófono, estriado por transparencia en tiempo húmedo. Superficie piléica lisa, glabra, brillante en tiempo seco, de color marrón gris oscuro, marrón gris claro, marrón ocre, más oscuro en el disco, más pálido hacia el margen, palideciendo fuertemente al secarse. Láminas moderadamente apretadas, adnatas o ligeramente libres, ventricosas, de color primero rosa pálido, después rosa marrón, arista irregular y concolor. Estípites hasta 80x7 mm, cilíndrico, comprimido, ligeramente bulboso, pruinoso en el ápice, estriado longitudinalmente, con tomento blanquecino hacia la base, de color marrón gris, marrón amarillo. Contexto escaso en el píleo, fibrilloso y el estípites, gris marrón en el cortex del píleo y del estípites, blanquecino en el resto, olor poco apreciable y sabor ligeramente rancio.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 7,5-13,5 x 7,0-12,0 µm / Q = 1,1-1,6; cruciformes o estrelladas. Basidios con cuatro esterigmas, juntas sin fíbulas. Arista laminar fértil. Queilocistidios ausentes. Pileipellis formada por un cutis de hifas cilíndricas de hasta 15 µm, elementos terminales algo hinchados, con pigmento intracelular marrón, juntas sin fíbulas.

Ecología. Sobre todo, en primavera, en lugares herbosos, en turberas, zonas musgosas o con *Sphagnum* sp., bajo coníferas y frondosas. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zea-nuri, 620m, en un claro de bosque herboso con *Quercus rubra*, 02/06/2018; leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, leg. J.A. Muñoz, BAR2018060209. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel., BAR2018060209, a. Basidiósporas, b. Basidios, c. Pileipellis. Escala barra: a y b = 10 µm, c = 40 µm.