




***Cortinarius suaveolens* Bataille & Joachim, Bull. Soc. Mycol. Fr., 36 : 85. 1920**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 90 mm de diámetro, primero subgloboso, después plano convexo, finalmente extendido; margen regular, delgado, opaco, enrollado largo tiempo. Superficie piléica separable, tenaz, viscosa, dulce, brillante, mate cuando se seca, con finas fibrillas innatas; de color liláceo, color malva púrpura claro, manchado de ocre naranja desde el centro. Láminas apretadas, desiguales, con numerosas lamelulas, estrechas, escotadas-adnatas, arista aguda, entera, concolor; de color lilacino, después marrón púrpura. Estípote hasta 80x15 mm, cilíndrico, con bulbo marginal, con reborde anguloso (hasta 35 mm), lleno, seco, fibrilloso; de color lilacino, que palidece desde el bulbo; cortina abundante, blanco lilacina, fugaz. Contexto espeso, firme, blanquecino, lilacino bajo la pileipellis y en el cortex del estípote; con olor fuerte y persistente de flor de naranja y sabor dulce. Reacciones químicas: KOH, marrón rojo en la pileipellis, nula en el contexto.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 11,5-14,5 x 6,0-7,5 µm / Q = 1,6-2,0; amigdaliformes o sub-citriformes, apiculadas, con gruesas verrugas, maculiformes, poco densas, amarillo leonado claro con KOH al 2%. Esporada marrón ferruginoso. Pileipellis filamentosa, muy gelificada, con hifas erectas, de hasta x6 µm, cilíndricas, septadas, fibuladas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas, en suelos ácidos. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** ARABA, Urkabustaiz, 600m, con *Quercus robur*, en suelo ácido, 8-X-2004, leg. & det. J.A. Muñoz. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius suaveolens Bataille & Joachim, a. Basidiósporas.