



***Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. [as '*bloxami*'], Syll. fung. (Abellini) 5: 684. 1887**


≡ *Entoloma madidum* var. *bloxamii* (Berk. & Broome) Largent, Madroño 22: 368. 1974

≡ *Entoloma madidum* (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France 1: 399. 1876

**Caracteres macroscópicos.** Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero convexo y por último plano convexo con un pequeño mamelón obtuso; margen involuto, no higrofano, no estriado; superficie piléica separable, seca, mate, pubescente y con la edad radialmente fibrillosa; de color primero azul, con reflejos azul-violeta, con tonos parduscos en la madurez. Láminas bastante apretadas, libre o un poco ventricosas; de color, primero, blanquecina, después rosa-salmón. Estípite hasta 70x20 mm, cilíndrico, adelgazado hacia la base; lleno, fibrilloso-estriado longitudinalmente; de color primero azul o gris-azulado, blanquecino o un poco amarillento hacia la base. Contexto firme, fibrilloso en el estípite, blanquecino, gris en el cortex; sabor y olor débilmente harinosos.

**Caracteres microscópicos.** Basidiósporas de 7,0-8,5 x 6,5-8,0 µm / Q = 1,0-1,3; sub-isodiamétricas con 5-7 ángulos en vista lateral, lisas. Queilostidios ausentes. Pileipellis formada por una fina ixocutis, con hifas hasta x4 µm, con pigmento azulado, juntas con fíbulas.

**Ecología.** En otoño, en prados y pastos, en suelos calcáreos o básicos. **Distribución.** Muy raro y localizado. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zeanuri, 750m, en un claro con briofitos con *Chamaecyparis lawsoniana*, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016102208. **Fotografía.** Jose A. Muñoz Sánchez.



*Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc., Bar2016102208, a. Basidiósporas, b. Arista laminar, c. Pileipellis.