




***Mycena supina* (Fr.) P. Kumm. [as '*supinus*'], Führ. Pilzk. (Zerbst): 108. 1871**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 10 mm de diámetro, primero campanulado o cónico-acampanado, después plano convexo; margen delgado, agudo. Superficie pileica, glabra, un poco pruinoso, estriado o surcado por transparencia, de color gris marrón, marrón rojizo pálido, pardo marrón, con el disco más oscuro. Láminas espaciadas, con laméculas, ventricosas, adnatas o decurrentes por un diente, de color gris blanquecinas con reflejos rojizos, ocre pálido; arista entera, blanquecina. Estípites de hasta 15 x 1 mm, filiforme, cilindráceo, flexuoso, pruinoso en la parte superior, glabro, gris marrón, marrón pálido, base fibrillosa. Contexto escaso, grisáceo, olor y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 8,5-11,0 x 8,0-10,5 µm / Q = 1,0-1,1; globosas o subglobosas, hialinas, con contenido opaco granuloso, gutuladas, amiloides. Basidios de hasta 35 x 12 µm, tetraspóricos, claviformes, juntas con fíbulas. Queilocistidios de hasta 40 x 14 µm, claviformes o subpiriformes, recubierto de pequeñas protuberancias poco densas, simples, de hasta 2 µm. Caulocistidios de hasta 40 x 14 µm, subglobosos o subpiriformes, recubierto de pequeñas protuberancias poco densas, simples, de hasta 2 µm. Pileipellis formada por una capa externa con hifas cilindráceas, de hasta 8 µm, que terminan con elementos engrosados o claviformes de hasta 40 x 10 µm, recubiertas de pequeñas protuberancias poco densas, simples o ramificadas, de hasta 6 µm.

Ecología. En verano y otoño sobre la corteza de ramas caídas de frondosas (*Castanea*, *Quercus*, *Ulmus*, etc.) **Distribución.** Relativamente frecuente. **Material estudiado.** ARABA, Subijana, 600m, sobre ramas muertas de *Quercus ilex*, 1-XII-2013, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2013120106. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Mycena supina (Fr.) P. Kumm., BAR2013120106, a. Basidiósporas, b. Queilocistidios. Escala barra = 10 µm.

