




***Peziza succosella* (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich, Israel
J. Bot. 23(3): 156. 1974**

≡ *Galactinia succosella* Le Gal & Romagn., Revue Mycol., Paris 5: 113. 1940

Caracteres macroscópicos. Ascomas en forma de apotecio de hasta 35mm, sésiles, cupuliformes, pero enseguida aplanado, con el borde incurvado; en algunos casos con un pseudoestípite a modo de prolongación. Superficie interna o fértil lisa, de color pardo oliváceo, pardo grisáceo o pardo rojizo. Cara externa lisa o finamente furfurácea, más clara en tonos pardo grisáceo pálido. Contexto muy delgado, frágil, al corte emana un latex primero incoloro que en unos minutos se vuelve amarillo ocráceo o amarillo oliváceo, sin olor ni sabor apreciable.

Caracteres microscópicos. Ascosporas de 15,5-19,0 x 9-12,5 µm, Q= 1,6-2,0; elipsoidales, con una o dos gúttulas lipídicas, adornadas con verrugas cianófilas de densidad moderada. Ascosporas de hasta 320 x 15 µm, 8-esporas, uniseriadas, amiloides, sin uncilo basal. Paráfisis filiformes, de hasta x10 µm, cilíndricos, septados y un poco abultados en lo alto, ramificados, con pigmento pardo-amarillento. Excípulo ectal de textura globosa.

Ecología. En verano y otoño, en bosques de frondosas, sobre suelos desnudos o con briofitos, taludes, bordes de caminos. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** CANTABRIA, Valdáliga, 50m, con *Quercus robur*, sobre suelo desnudo y húmedo, 12-X-2019, leg. & det. J.A. Muñoz Sánchez, BAR2019101206. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich, BAR2019101206, a. Ascosporas, b. Paráfisis, c. Ascosporas, d. detalle ascos y ascosporas. Escala barra: a y b = 10 µm, c y d = 20 µm.