




***Cortinarius emunctus* Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsaliae): 275, 1838 [1836-1838]**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 110 mm de diámetro, primero hemisférico, campanulado, después convexo a plano convexo, más o menos umbonado, margen regular, enrollado y flexuoso, cutícula piléica viscosa, lisa, brillante, dulce, de color grisáceo violeta, violáceo, con el disco ocre amarillento. Láminas bastante apretadas, desiguales, con numerosas lamélulas, anchas de hasta 8mm, escotado-adnatas, de color gris lilacino al principio, después pálido beige, ocre marrón en la madurez, arista un poco crenulada, concolor o un poco más clara. Estípite hasta 70x12 mm, delgado-cilíndrico abultado hacia la base, primero lleno, hueco en la madurez, viscoso, adornado de fibrillas longitudinales blanquecinas sobre un fondo lilacino, cortina abundante, gris lilacino, ocre ferruginoso en la madurez. Contexto espeso, crema ocráceo, gris azulado en lo alto, con olor agradable y sabor dulce.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-8,5 x 5,5 -6,5 μm / Q = 1,1-1,3, subesféricas, apiculadas, adornadas con verrugas de densidad moderada, amarillo-leonado claro con KOH al 2%. Esporada pardo-ferruginosa. Pileipellis gelificada, con hifas tumbadas, más o menos entremezcladas, de hasta x10 μm , pigmentadas de amarillento, juntas con fibrillas.

Ecología. En verano y otoño en bosques montanos de frondosas (*Fagus*, *Quercus* y *Betula*) y de coníferas (*Picea*, *Abies*), en suelos ácidos. **Distribución.** Muy raro. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zeanuri, 750m, en bosque mixto con *Picea abies*, *Fagus sylvatica* y *Betula alba*, en suelo ácido, 12-X-2016, leg. José A. Muñoz Sánchez, det.: José A. Muñoz Sánchez, rev. J.A. Cadiñanos Aguirre, BAR2017092311. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius emunctus Fr., BAR2017092311, a. Basidiósporas. Escala barra: a = 10 μm .

