




***Cortinarius amarescens* M.M. Moser, Sydowia 6(1-4): 68 (1952)**

Caracteres macroscópicos. Pileo de hasta 100 mm de diámetro, primero convexo, finalmente plano convexo o con el margen algo levantado, margen enrollado, entero o un poco excedente, superficie piléica separable, viscosa en tiempo húmedo, dulce, brillante en tiempo seco, de color ocre amarillo, amarillo naranja, amarillo pálido, más claro hacia el margen. Láminas apretadas, escotado-adnatas, estrechas, de color crema blanquecino a crema ocráceo, arista aserrada, blanquecina. Estípote hasta 110 x 25 mm, claviforme, lleno, con bulbo ancho (hasta 35 mm), muy fibriloso, de color blanquecino, manchándose de ocre amarillo en el bulbo, cortina abundante, primero blanquecina, ferruginosa en la madurez. Contexto espeso, firme, blanco, olor ligero a miel, sabor poco destacable. Reacciones macroquímicas: KOH, marrón-rojo en la pileipellis.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 10,0-12,5 x 6,0-7,0 μm / Q = 1,6-1,9, amigdaliformes, apiculadas, con ornamentación moderada a fuerte, con verrugas poco saliente, amarillo leonado claro con KOH al 2%. Esporada pardo ferruginosa. Pileipellis filamentosa, gelificada, con hifas de hasta x8 μm , tumbadas, cilíndricas, con pigmento vacuolar amarillo, fibuladas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas (*Fagus* y *Quercus*). **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** ARABA, Zigoitia, 600m, con *Quercus ilex*, en suelo básico, 02-XII-2018, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Cadiñanos, BAR2018120214. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius amarescens M.M. Moser", BAR2018120214, a. Basidiósporas, b. Pileipellis.