




***Hygrocybe conicoides* (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling, Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh 29 (1): 131. 1969**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero cónico o cónico campanulado, después plano convexo, finalmente extendido, con el centro con un neto umbón obtuso, margen ondulado, pronto recto, finamente estriado en la madurez, superficie piléica lisa, brillante, higrofana, un poco viscosa en tiempo húmedo, en tiempo seco fibrillosa, de color rojo vivo, rojo oscuro, rojo naranja hacia el margen, puede ennegrecer ligeramente en la madurez. Láminas no muy apretadas, libres, ventricosas, de color amarillo, amarillo naranja, rojo naranja, arista entera o un poco irregular, algo más clara. Estípite de hasta 100 x 10 mm, cilíndrico, adelgazado hacia la base, hueco, fibrilloso estriado, de color amarillo naranja, rojo naranja, especialmente en la parte superior, blanquecino hacia la base. Contexto fibrilloso, rojo en el píleo, rojo amarillo en el estípite, ennegrece muy lenta y levemente en varias horas, olor y sabor poco destacables.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 11,5-15,5 x 5,5-6,5 µm / Q = 1,7-2,3, elípticas, cilíndricas o alantoides, lisas, hialinas. Esporada blanca. Basidios de hasta 50 x 10 µm, tetraspóricos, claviformes, juntas con fibulas. Cistidios ausentes, arista fértil. Trama laminar regular o paralela. Pileipellis formada por un cutis o ixocutis, con hifas más o menos entremezcladas, artículos terminales cilíndricos o fusiformes, de calibre x 6-15 µm.

Ecología. En otoño y principios de invierno, en dunas arenosas del litoral marino. **Distribución.** Muy raro. **Material estudiado.** CANTABRIA, San Vicente de la Barquera, 6m, en duna del litoral, 2-XI-2018, 6m, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2018110281. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling, BAR2018110281, a. Basidiósporas, b. Pileipellis.