




Russula praetervisa Sarnari, Monografía Ilustrada del Genere Russula in Europa 1: 463 (1998)

Caracteres macroscópicos. Pileo de hasta 100 mm de diámetro, primero convexo, después extendido e incluso deprimido, margen delgado, incurvado, acanalado tuberculado; superficie piléica, separable hasta 2/3 del radio, brillante, ligeramente viscosa en tiempo húmedo, venosa en sentido radial, de color pardo grisáceo, pardo ocráceo, pardo gris oscuro en el disco, con pequeñas manchas rojizas dispersas. Láminas apretadas al principio, más separadas con la edad, poco anchas (hasta 6mm), adnato-atenuadas, bifurcadas, muy quebradizas, de color primero blanco, después crema pálido, con manchas ocráceas en la madurez; arista entera y concolor. Estípito de hasta 70 x 30 mm, cilíndrico o subclaviforme, pronto ahuecado cavernoso, pruinoso en la parte superior, rugoso venoso, de color blanco, manchándose de gris sucio u ocráceo, muy frecuentemente toma tonos pardo rojizos hacia la base. Contexto espeso, firme, quebradizo, blanco, manchándose de ocre ferruginoso en el estípito, olor desagradable, como a pescado, sabor dulce pero desagradable, las láminas pueden ser dulces o acres en unos minutos. Reacciones macroquímicas: Resina de Guayaco rápida e intensa.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-8,5 x 5,0-6,5 μm / Q = 1,2-1,4, ovoides, verrugoso-punteadas, con verrugas cónicas, hasta x 1,2 μm , con algunos finos conectivos formando un retículo poco marcado. Esporada crema. Cistidios de hasta 100 x 11 μm , poco abundantes, fusiformes o claviformes, con un pequeño apéndice en la parte superior, reacción positiva a la sulfovanilina. Pileipellis formada por: c) pelos en general cilíndricos, septados, ramificados, elementos terminales obtusos o atenuados, de hasta x5 μm . d) dermatocistidios subfusiformes, atenuados en el ápice o terminados en tetina, de hasta 8 μm , con contenido pardo negro en contacto con la SV.

Ecología. En verano y otoño, en bosques de frondosas, especialmente *Quercus* sp., en zonas aclaradas y herbosas, en general en suelos calcáreos. **Distribución.** Muy común. **Material estudiado.** MADRID, San Sebastián de los Reyes, 640 m, con *Quercus ilex*, en suelo neutro 21-XI-2018, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2018112102. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Russula praetervisa Sarnari, BAR2018112102, a. Basidiósporas, b. Cistidios, c. Pelos de la Pileipellis, d. Dermatocistidios. Escala barra: a = 5 μm , b, c y d = 10 μm .