





***Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl., Encyclop. Mycol. (Paris) 14: 12. 1949 [1948]**

Caracteres macroscópicos. Píleo de 10-35 mm de diámetro, inicialmente cónico-convexo, después convexo a plano convexo; margen delgado, agudo, irregular, sin restos de velo (se observa en un ejemplar restos fibrillosos muy fugaces hacia el margen ¿?); superficie pileica higrófana, estriada por transparencia hasta la mitad del radio o más, en tiempo húmedo, de color marrón o marrón naranja, crema pálido en tiempo seco, aunque mantiene una coloración ocrácea en el disco. Láminas no muy apretadas, con lamélulas, anchas hasta 4mm, adnatas, primero gris crema pálido, después gris marrón oscuro a pardo negruzco en la madurez; arista entera, blanquecina, pero con zonas rojo-rosa repartidas de forma irregular. Estípite de 30-120 x 2-5 mm, filiforme, cilíndrico, poco o nada abultado en la base, pruinoso en la parte superior, blanco, traslúcido, crema blanquecina en la madurez. Contexto escaso, crema, olor y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de $(10,2) 11,8 \pm 0,65 (13,0) \times (5,4) 6,1 \pm 0,28 (6,5)$, Qm = $(1,7) 1,9 \pm 0,10 (2,1)$, n = 35, oblongas, subcilíndricas, subamigdaliformes vistas de perfil, pardo marrón rojo, con poro germinativo central (hasta 2 µm). Queilocistidios de hasta 70 x 16 µm, lageniformes, fusiformes, poco abundantes. Pleurocistidios similares a los Queilocistidios.

Ecología. En otoño, en praderas y pastos, en zonas con abundantes restos vegetales. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** BIZKAIA, Orozko, Aldabide, 30TWN1469, 720m, en una pradera natural calcárea, en una zona con restos vegetales de *Erica* y *Crataegus*, 29-X-2017, leg. J.A. Muñoz, BAR2017102913. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl., BAR2017102913, a. Basidiósporas, b y c. Queilocistidios, Escala barra a = 10 µm, b y c = 20 µm.