




***Clitocybe fragilipes* J. Favre, Ergebn. wiss. Unters. schweiz. Natn Parks 6 (42):425. 1960**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 40mm de diámetro, primero plano convexo, pronto aplanado y un poco infundibuliforme; margen enrollado al principio, puede estar estriado por transparencia. Superficie higrófana, lisa; de color en tiempo húmedo, marrón grisáceo, ocre marrón, más pálido hacia el margen, en tiempo seco palidece hasta el blanquecino, pero con el centro algo más oscuro u ocráceo. Láminas más o menos apretadas, de adnatas a decurrentes; de color crema blanquecino. Estípite de hasta 65 x 6mm, cilíndrico, liso; del color del píleo, pero algo más claro. Contexto higrófano, concolor al píleo; olor y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-8,5 x 3,5-5,5 μm / Q= 1,5-1,9; elipsoides, lisas, hialinas, gutuladas, cianófilas. Esporada crema pálido. Basidios de hasta 28 x 6 μm , claviformes o subcilíndricos, tetráspóricos, juntas con fíbulas. Queilocistidios ausentes. Pileipellis formada por un cutis de hifas paralelas o más o menos entremezcladas, hasta x7 μm , con pigmento intracelular, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de coníferas. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** ARABA, Zuia, Arlobi, 780m, bajo *Pseudotsuga menziesii*, 24-X-2015, leg. & det. J.A. Muñoz & J.A. Cadiñanos, BAR2015102407. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Clitocybe fragilipes J. Favre, BAR2015102407, a. Basidiósporas, b. Basidios. Escala barra = 10 μm .

