




***Inocybe phaeodisca* Kühner, Bulletin de la Société des Naturalistes d'Oyonnax 9 (suppl.): 5. 1955**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 40 mm de diámetro, subcónico, cónico acampanado, después plano convexo, manteniendo un umbón obtuso más o menos marcado; margen primero incurvado, después recto, con abundantes restos de velo blanquecinos; superficie pileica fibrillosa, un poco escamosa en el disco, con abundantes fibrillas lanosas hacia el margen; de color ocre marrón, marrón castaño en el disco, aclarándose hacia la periferia en tonos crema blanquecinos o blanquecino. Láminas no muy prietas, marginadas, más o menos adnatas o uncinadas, ventricosas, de color primero blanquecina, ocre marrón en la madurez. Estípites de hasta 60 x 8 mm, alargado, cilíndrico, con la base poco abultada; pruinoso en el ápice, cubierto en casi toda de amplias y groseras fibrillas longitudinales blanquecinas, sobre un fondo crema rosado; Contexto espeso, blanquecino, olor en la recolecta ligeramente a pelargonio que desaparece horas después, sabor poco apreciable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de $(8,4) 9,0 \pm 0,49 (10,2) \times (4,8) 5,1 \pm 0,21 (5,6) \mu\text{m}$ / Qm = $(1,6) 1,8 \pm 0,10 (2,0)$; lisas, subamigdaliformes o subcitriformes, con el ápice cónico, amarillo ocre en KOH al 3%. Queilocistidios de hasta $70 \times 20 \mu\text{m}$, subfusiformes, algunos subutriformes, metuloides, con el cuello prolongado, con paredes gruesas de hasta $2 \mu\text{m}$ en la parte superior, acompañados de paracistidios clavados o piriformes de pared delgada. Caulopellis formada por pelos alargados, cilíndricos, septados, con el ápice algo abultado de hasta $\times 8 \mu\text{m}$.

Ecología. En verano y otoño, bajo frondosas. **Material estudiado.** CANTABRIA, Valdálga, La Madrid, 70m, con *Quercus robur*, en suelo ácido, 12-X-2019, leg. & det. J.A. Muñoz, rev. F. Pancorbo. BAR202019101212. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Inocybe phaeodisca Kühner, BAR2019101212, a. Basidiósporas, b y c. Queilocistidios, d. Caulocistidios. Escala barra a,b y c = 10 μm , d = 40 μm .