




Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas, Schweiz. Z. Pilzk. 47: 214. 1969

≡ *Limacella delicata* var. *vinosorubescens* (Furrer-Ziogas) Gminder, in Gminder, Z. Mykol. 80(2): 647. 2014

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, finalmente extendido más o menos ondulado y ligeramente umbonado, margen inflexo, agudo, adornado de restos de velo floconosos en los ejemplares jóvenes, superficie piléica viscosa y brillante en estado húmedo, mate en estado seco, afieltrado o finamente escamoso, de color vinoso, marrón vinoso o rosado vinoso. Láminas apretadas, anchas, libres, de color primero crema blanquecino, se manchan progresivamente de rosa vinoso, arista entera, primero concolor después rosada. Estípite de hasta 70 x 15 mm, cilíndrico o claviforme, primero lleno, hueco en la madurez, superficie lisa, mate, blanquecina a rosada por encima de la zona anular, que puede exudar finas gotas en los carpóforos jóvenes, por debajo del velo con abundantes fibrillas longitudinales rosadas, zona anular blanquecina, fibrillosa y membranosa. Contexto poco firme, rosada al corte, sin olor ni sabor apreciable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 3,5-5,0 x 3,0-4,0 µm / Q = 1,0-1,1, subesféricas, lisas, hialinas, gutuladas. Esporada crema blanquecino. Basidios de hasta 25 x 7 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fíbulas. Cistidios no observados. Pileipellis formada por un ixotrichoderma, de elementos levantados, cilíndricos, hialinos, de hasta 50 x 4 µm, pigmentadas de marrón, juntas con fíbulas.

Ecología. En bosques de frondosas (*Fagus* y *Quercus*) o bosques mixtos con coníferas. **Distribución.** Muy raro. **Material estudiado.** BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 380m, con *Quercus robur* y *Pinus radiata*. 6-X-2017, leg. & det. J. A. Muñoz, 6-X-2016, BAR2017100609. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas, BAR2017100609. a. Basidiósporas, b y c. Pileipellis.