



***Cotylidia pannosa* (Sowerby) D.A. Reid, Beih. Nova Hedwigia 18: 81.1965**


≡ *Thelephora pannosa* (Sowerby) Fr., *Syst. mycol.* (Lundae) 1: 430. 1821

= *Cotylidia pallida* (Pers.) Boidin, *Revue Mycol.*, Paris 24: 201. 1959

Caracteres macroscópicos. Fructificaciones turbinadas, embudadas o espatuladas, aisladas, de hasta 40mm de diámetro o formando masas agrupadas de hasta 100 mm de longitud. Superficie rugosa, hispida, seca, débilmente zonada, de color crema, naranja ocráceo, tomando, muy frecuentemente, tonalidades rojo naranja, especialmente hacia la periferia. Himenóforo o superficie fértil sillonado, surcado radialmente, de color blanquecino, crema blanquecino, rojizo naranja en la parte superior. Trama de consistencia tenaz o suberosa, olor débil fúngico, sabor un poco amascento.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-9,0 x 4,5-5,5 µm / Q = 1,6-1,9, elípticas, lisas, hialinas, apiculadas. Cistidios de hasta 170 x 15 µm, claviformes, lisos, con paredes espesas. Basidios de hasta 60 x 8 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas sin fibulas. Sistema de hifas monomítico, hifas hasta x6 µm, con paredes delgadas, septadas, juntas sin fibulas.

Ecología. En zonas con abundantes restos vegetales (agujas, frutos y pequeñas ramas), en bosques de *Fagus sylvatica*, *Abies alba* y *Picea abies*. **Distribución.** Muy raro. **Material estudiado.** CANTABRIA, Saja, Puerto de la Palombrera, 650m, con *Fagus sylvatica*, en borde de camino entre restos vegetales, 15-IX-2018, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2018091501. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid, BAR2018091501, a. Basidiosporas, b. Basidios, c. Cistidios, d. Sistema de hifas.