




***Hygrophoropsis rufa* (D.A. Reid) Knudsen, in Knudsen & Vesterholt, Funga Nordica, Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera (Gylling): 913 (2008)**

**Caracteres macroscópicos.** Píleo de hasta 40 mm de diámetro, primero convexo, pronto extendido o incluso algo deprimido, ligeramente umbonado; margen fuertemente involuto, manteniéndose más o menos incurvado. Superficie piléica seca, mate, tomentosa a granulos-tomentosa; de color marrón oscuro, marrón oliváceo, con un fondo amarillo naranja vivo, especialmente hacia la periferia, margen incluso blanquecino. Láminas más o menos apretadas, estrechas, fuertemente decurrentes, ahorquilladas hacia el margen piléico; de color naranja vivo en la juventud, amarillo naranja en la madurez. Estípite de hasta 40 x 11 mm, claviforme o cilindráceo, superficie seca, mate, finamente tomentosa en la parte superior; de color amarillo naranja, pardo ocre rojizo hacia la base, pardo oliváceo en la madurez. Contexto espeso, blanquecino amarillento; sabor acidulado, olor suave poco definido.

**Caracteres microscópicos.** Basidiósporas de 5,5-7,0 x 3,5-4,5 µm / Q = 1,4-1,8; de elipsoides a ovoides, lisas, con paredes delgadas, amarillo ocre en KOH, marrón rojizas en Melzer. Basidios de hasta 25 x 7 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fibulas. Cistídios de hasta 35 x 8 µm, lageniformes o claviformes. Pileipellis formado una trichoderma, con hifas más o menos entremezcladas de forma irregular, de hasta 12 µm, más o menos cilíndricas, elementos terminales fusiformes con el ápice obtuso; con pigmento marrón oscuro, especialmente en la capa más superior.

**Ecología.** En verano y otoño en bosques de coníferas. **Distribución.** Muy raro, RR. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zeanuri, 750 m, con *Picea abies*, 24-IX-2016, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Muñoz, BAR2016092426. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



*Hygrophoropsis rufa* (D.A. Reid) Knudsen, BAR2016092426, a. Basidiósporas, b. Basidios, c. Cistídios, d. Pileipellis.