




***Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.) Singer, Lloydia 8(3): 141.1945**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 120 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo y por último más o menos extendido, margen primero involuto, después recto, apendiculado con restos blanquecinos de velo sobre todo en los ejemplares jóvenes, superficie piléica, separable, lisa, brillante y viscosa en tiempo húmedo, de color marrón rosado, marrón amarillo, incluso pardo rojizo, palideciendo en tiempo seco, con restos blanquecinos del velo general a modo de pequeñas escamas. Láminas apretadas, desiguales, escotadas, de color primero blanco, después crema a crema beige, arista un poco erosionada, blanquecina. Estípote de hasta 100 x 6 mm, cilíndrico, fuertemente engrosado hacia la base con un bulbo marginado más o menos evidente de hasta 35mm, lleno, seco, fibrilloso, blanco o blanco crema, con cortina abundantemente blanca. Contexto grueso, blanquecino, olor y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-9,0 x 4,0-5,5 μm / Q = 1,5-1,8, elípticas u ovales, con apícula evidente, lisas, gutuladas, hialinas, no amiloides. Esporada blanquecina. Queilocistidios y Pleurocistidios ausentes. Pileipellis formada por una ixocutis con hifas más o menos entremezcladas, de hasta x6 μm , subpelis paralelas, tumbadas, de hasta x5 μm , juntas con fibulas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de coníferas, más raramente bajo frondosas, en suelos neutros. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BIZKAIA, Zeanuri, 750m, con *Picea abies*, en suelo calcáreo, 01-X-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016100116. *Ibidem*, 04-X-2021, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2021100301. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer, BAR2016100116, a y b. Basidiósporas, c. Pileipellis.