




***Cortinarius praestans* (Cordier) Gill., Hyménomycètes France, 475.1876 [1878]**

Caracteres macroscópicos. Píleo hasta 250 mm de diámetro, al principio globoso, después hemisférico y más aplanado, finalmente extendido. Margen enrollado, de rizado a acanalado, apendiculado. Superficie muy viscosa, separable, de color pardo-púrpura a pardo-ocráceo, incluso ocre-amarillo, con abundantes restos blanquecinos del velo. Láminas apretadas, escotadas adnatas; de color, inicialmente, gris-violáceo pálido, después de ocráceo a pardo-ferruginoso. Estípote hasta 250 x 60 mm, muy robusto y ventruado en los jóvenes, después más cilíndrico pero con la parte baja ensanchada y muy a menudo atenuado radicante hacia la base; superficie recubierta en los jóvenes de un velo fibrilloso violáceo, sobre un fondo fibrilloso blanco, formando unas bandas muy notorias; cortina muy densa, blanco violácea, que deja abundantes restos en lo alto. Contexto grueso, muy firme, blanco, ligeramente azulado en lo alto del estípote y en la base del mismo; olor suave y agradable y sabor dulce.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 13-18 x 7-10 µm y Q = 1,6-2; amigdaliformes o ligeramente fusiformes, con una gútula, bastante verrugosas. Esporada pardo ferruginosa. Pileipellis formada por hifas paralelas fibuladas, pigmentadas de pardo amarillo, de x 3-9 µm, muy gelificadas, sobre todo hacia el exterior donde aparecen más fragmentadas.

Ecología. En verano y otoño, bajo frondosas sobre todo *Quercus* y *Fagus*. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BARCELONA, Pruit, 900m, con *Fagus sylvatica*, 19-X-2005, leg. & det. J.A. Muñoz. **Fotografías.** J.A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius praestans (Cordier) Gill., a. Basidiósporas, b. Basidiocarpos, ARABA, Abornikano, 600m, con *Fagus sylvatica* y *Quercus robur*, 8-X-2001, leg. & det. J.A. Muñoz.

