




***Hygrocybe insipida* (J.E. Lange) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Edn 3 (Stuttgart) 2b/2: 65. 1967**

≡ *Hygrocybe reai* var. *insipida* J. Lange, Dansk bot. Arkiv 4(4): 26, 1923 [basion.]
 ≡ *Gliophorus insipidus* (J.E. Lange) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 80. 1958

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 30 mm de diámetro, primero hemisférico, después plano convexo, finalmente extendido, ligeramente deprimido, margen fino, excedente, irregular, estriado por transparencia o un poco crenulada; superficie pileica lisa, brillante, higrófana, un poco viscosa en tiempo húmedo, de color rojo sobre todo al principio, después rojo naranja, naranja amarillento, con el margen amarillento. Láminas poco apretadas, de adnatas a decurrentes, ventricosas, intervenadas, de color amarillo naranja, crema amarillo, amarillo dorado; arista entera un poco más clara. Estípite de hasta 60 x 3 mm, cilíndrico, flexuoso, comprimido en algunos casos, adelgazado hacia la base, hueco, superficie finamente fibrillosa, lisa, húmedo o un poco lubricado al momento de la recolecta, pero pronto seco y mate en varias horas, de color rojizo, naranja o amarillo dorado. Contexto fibrilloso, céreo, rojizo bajo la pileipellis, amarillenta en el resto; olor y sabor poco destacables.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de (7,3) 8,3 ± 0,80 (10,6) x (3,8) 4,4 ± 0,40 (5,6) µm / Q = (1,6) 1,9 ± 0,18 (2,3), elipsoides, cilíndricas u oblongas, se observan algunas con los bordes constreñidos en ambos lados y en vista frontal, lisas, hialinas. Esporada blanca. Basidios de hasta 50 x 8 µm, mayoritariamente tetraspóricos, se observan algunos con 1,2 y 3 esterigmas, claviformes, juntas con fíbulas. Cistidios ausentes, arista fértil. Trama laminar subregular, con elementos más o menos inflados. Pileipellis formada por un ixocutis, con hifas más o menos entremezcladas, artículos terminales cilíndricos o fusiformes, de calibre x 6 µm.

Ecología. En otoño y principios de invierno, en prados y pastos no abonados, en claros de bosque. **Distribución.** Poco frecuente, R. **Material estudiado.** CANTABRIA, Udias, 240m, en un claro herboso con *Sequoia sempervirens*, 12-XII-2021, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2021121202. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser, BAR2021121202, a. Basidiósporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.

