



***Clitocybe amarescens* Harmaja, Karstenia 10: 98.1969**


≡ *Lepista amarescens* (Harmaja) Harmaja, Karstenia 15: 14. 1976

= *Clitocybe nitrophila* Bon, Doc. Mycol. 9(no. 35): 43. 1979

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 65 mm de diámetro, plano convexo a extendido y umbilicado. Superficie lisa, higrófana, estriada al margen por transparencia; de color marrón, marrón pálido, palideciendo en tiempo seco a tonos blanquecino amarillento. Láminas apretadas, decurrentes, primero pálidas y concolor al píleo en la madurez. Estípite de hasta 70 x 7 mm, cilíndrico, un poco aplastado, concolor al píleo. Contexto higrófano, concolor al píleo; sabor y olor poco apreciable. Esporada crema blanquecino.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 5-8 x 3,5-5 µm / Q = 1,6-1,9; elípticas, cianófilas, lisas. Esporada blanquecina. Basidios de hasta 30 x 7 µm, claviformes o subcilíndricos, tetraspóricos, juntas con fíbulas. Queilocistidios ausentes. Pileipellis formando un cutis o con hifas subparalelas de hasta x4 µm, con pigmento intracelular, juntas con fíbulas.

Ecología. En suelos nitrogenados de bosques de frondosas y de coníferas, incluso sobre excrementos de herbívoros. **Distribución.** Poco común. **Material estudiado.** BIZKAIA, Orozko, 650m, bajo *Pinus radiata*, sobre a estiércol de vacuno, 12-XII-2014, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2014121207. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Clitocybe amarescens Harmaja, BAR2014121207, a. Basidiósporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.