




***Pluteus salicinus* (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 99 (1871)**

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 70 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, finalmente extendido y ligeramente umbonado, margen agudo, un poco estriado en tiempo húmedo, superficie piléica lisa, mate, un poco lubricada en tiempo húmedo, finalmente fibrillosa radialmente, de color gris pálido, gris marrón, gris verdoso, gris negro en el disco. Láminas moderadamente apretadas, anchas, libres, de color primero blanco crema, finalmente rosa carne, arista blanca o finamente floconosa. Estípote de hasta 80 x 8 mm, cilíndrico, ligeramente engrosado hacia la base, lleno, hueco en la madurez, cubierto de finas fibrillas blanquecinas, de color blanco o blanco crema. C0ntexto delgado, frágil, blanquecino, olor ligero rabanoide, sabor poco destacable.

Basidiósporas de 7,5-9,5 x 5,0-7,0 μm / Q = 1,2-1,6, elipsoidales, subcilíndricas, lisas, hialinas, gris rosa vistas en agua. Esporada pardo rosada. Queilocistidios de hasta 60 x 25 μm , claviformes. Pleurocistidios (b, c) de hasta 100 x 30 μm , fusiformes, con paredes gruesas, culminados con 2 a 4 ganchos. Pileipellis (d) formada por una trichoderma de hifas tumbadas, más o menos paralelas, artículos terminales fusiformes de hasta 250 x 30 μm , con pigmentación ocre, juntas con fibrillas.

Ecología. En verano y otoño, sobre madera muy degradada descomposición de frondosas. **Distribución.** Poco frecuente. **Material estudiado.** BIZKAIA, Orozko, 600m, sobre madera degradada de *Fagus sylvatica*, 06/07/2013, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR2013070605. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm., BAR2013070605, a. Basidiósporas, b y c. Pleurocistidios, d. Elementos terminales de la Pileipellis.