



Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud., Icônes Mycologicae Sér. 1 (Livr. 2): [3]. 1904

=*Peziza stercorea* Pers., Observations mycologicae 2: 89. 1800 [basionym]

Scutellinia stercorea (Pers.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 869. 1891

Sarcoscypha stercorea (Pers.) Rehm, Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze - Ascomyceten 1.3 (44, 53 & 54): 1056. 1895


Caracteres macroscópicos. Ascosmas en apotecio, globosos, sésiles o ligeramente cupuliformes, de hasta 3 mm de diámetro; superficie interna o fértil, lisa, suavemente cóncava, de color naranja, naranja amarillo; cara externa mate, lisa, de color naranja pálido, cubierta de numerosos pelos parduscos, más evidentes hacia el margen. Contexto frágil, poco consistente, sin olor ni sabor destacable.

Caracteres microscópicos. Ascosporas de $(16,5) 18,4 \pm 1,20 (22,2) \times (8,2) 9,1 \pm 0,80 (11,0) \mu\text{m}$; $Q = 2,0 \pm 0,2 (2,4)$; uniseriadas, elípticas, hialinas, lisas, con pared delgada. Ascos de hasta $230 \times 16 \mu\text{m}$, octosporadas, uniseriadas, hialinas, con uncilo basal. Paráfisis de hasta $\times 4 \mu\text{m}$, delgado, rectos, filiformes, elementos terminales claviformes, ensanchados en el ápice (hasta $\times 8 \mu\text{m}$), septados, ramificados y con pigmento amarillo naranja. Pelos marginales de hasta $600 \times 30 \mu\text{m}$, cilíndricos o subulados, con el ápice obtuso, con paredes espesas, septados, con la base multifurcada, con pigmento pardo marrón. Pelos laterales estrellados, con 2-4 puntas, de hasta $140 \times 18 \mu\text{m}$, septados, con pared gruesa, con pigmento pardo marrón. Excipulo ectal de estructura globosa angulosa, con células globosas, de hasta $\times 50 \mu\text{m}$, hialinas o con suave pigmento granular amarillo naranja,

Ecología. Casi todo el año sobre estiércol o excrementos de vaca o caballo, formando grandes colonias de ascosmas unidos entre sí. Distribución. Relativamente frecuente, C. Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, 600 m, sobre excrementos de vaca, 06-07-2013, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2013070610. CANTABRIA, Villaverde de Trucios, 770 m, sobre excrementos de vaca, 01-IV-2023, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2023040101. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud., BAR2013070610, a. Ascosmas.



Cheilymenia stercorea, BAR2023040101; a. Ascomas, b. Ascosporas, c. Pelos laterales. d. Pelos marginales, Pelos laterales y excipulum ectal, e. Pelos marginales, f. Ascospores y parafisis, g. Pelos laterales y excipulum ectal. Escala barra: b y g = 10 µm. c, e y f = 40 µm. Fotografías. José A. Muñoz Sánchez.