




Inocybe pyriodora (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 79. 1871

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de hasta 70 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo a plano convexo, con un suave umbón obtuso, margen primero involuto, después recto, apendiculado con restos blanquecinos de velo sobre todo en los ejemplares jóvenes, superficie piléica, primero lisa, cubierta de un fino velo blanquecino, que tiende a romperse en finas escamas concéntricas, de color ocre claro, ocre amarillento u ocre marrón. *Láminas* espaciadas, anchas, no muy gruesas, adnatas, ventricosas, de color primero crema blanquecino, después ocre herrumbre, arista más o menos erosionada, blanquecina. *Estípite* de hasta 70 x 10 mm, cilíndrico o bulboso hacia la base, superficie floconosa en la parte superior, el resto finamente fibrillosa, de color crema blanquecino a ocre, enrojece un poco hacia la base y a la presión. *Contexto* delgado, firme, crema, que enrojece al corte, oscureciéndose después de varios minutos; olor complejo para unos de pera, para otros de azúcar quemado o de bálsamo del Perú (KUYPER, 1986).

Caracteres microscópicos. *Basidiósporas* de 8,0-11,5 x 6,0-7,0 μm / Q = 1,6-2,0, amigdaliformes, subamigdaliformes, con papila apical, lisas. Esporada pardo marrón. *Queilocistidios* de hasta 70 x 20 μm , diversos, subfusiformes, subclaviformes, con paredes espesas de hasta x 3 μm , metuloides, con el cuello más o menos alargado. *Caulocistidios* de hasta 70 x 20 μm , en la parte superior del estípite, no metuloides, ventrudos o fusiformes.

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y de coníferas, suelos neutros. Distribución. Poco frecuente, R. Material estudiado. ARABA, Ribera Alta, Subijana, 600m, con *Quercus ilex*, en suelo calcáreo, 17-XII-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016121708. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Inocybe pyriodora (Pers.) P. Kumm., BAR2016121708, a. Basidiósporas, b. Pileipellis.