




Lepiota oreadiformis Velen., České Houby 1: 215. 1920

=*Lepiota gracilis* var. *laevigata* J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 1): 52, 1915
 =*Lepiota laevigata* (J.E. Lange) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 4): 47, 1923
 =*Lepiota pratensis* (Bull.) Bigeard & H. Guill., Fl. Champ. Supér. France (Chalon-sur-Saône) 1: 58, 1909

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de 20 - 70 mm de diámetro, al principio hemisférico o cónico campanulado, después plano convexo, suavemente umbonado, margen pronto recto, apendiculado con restos de velo blanquecino; superficie pileica lacerada, con pequeñas escamas fibrillosas; de color leonado, ocre-leonado, ocre-anaranjado, más claro hacia el margen piléico en tonos cremas blanquecinos. *Láminas* apretadas, con numerosas lamélulas, libres, un poco ventricosas, de color blanco, después crema blanquecino; arista laminar floculosa, concolor. *Estipite* de 40 - 90 × 3 - 8 mm, cilíndrico, un poco abultado hacia la base, primero lleno, después hueco, recubierto de flecos, de color crema blanquecino o crema- por encima del anillo, crema ocre en la zona de la inserción con el pileo y por debajo; zona anular no bien delimitada y que se reduce a abundantes copos fibrillosos. *Contexto* poco consistente, blanquecino en el pileo, rosado en el estipite; olor y sabor poco apreciables.

Caracteres microscópicos. *Basidiósporas* de (10,3) 11,0 ± 0,58 (15,4) × (3,9) 4,5 ± 0,27 (4,9) µm, Q = (2,3) 2,5 ± 0,12 (2,7); fusiformes, con el ápice obtuso, con depresión suprapical, dextrinoides. Esporada blanca. *Queilocistidios* hasta 40 × 13 µm, claviformes, utriformes o cilíndricos. *Pileipellis* formada por hifas erectas, septadas, de hasta 250 × 15 µm, los elementos terminales son alargados, cilíndricos y un poco atenuados o redondeados en el ápice, con abundantes elementos más cortos cilíndricos o clavados de hasta 55 × 14, con pigmentación marrón. Juntas con fíbulas en todo el carpóforo.

Ecología. En verano y otoño en prados y zonas abiertas, claros de bosque de frondosas, especialmente bajo *Quercus* spp., en suelos calcáreos. Distribución. Relativamente común, E. Material estudiado. CANTABRIA, San Vicente de la Barquera, 45 m, en un prado calcáreo, 29-X-2023, leg. J.A. Muñoz Sánchez, BAR2023102901. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Lepiota oreadiformis Velen., BAR2023102901, a. Basidiósporas, b. Pileipellis. Escala barra: a = 10 µm, b = 40 µm.

