





***Cortinarius uliginobtus* Rob. Henry, Bulletin de la Société Mycologique de France 56: 109. 1941**

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* en grandes grupos +50, algunos cespitosos. *Pileo* de 12-35 mm de diámetro, primero cónico, cónico convexo, después convexo a plano convexo, manteniendo en todos los casos un umbón obtuso bien marcado; margen un poco incurvado al principio, agudo, pronto recto, blanquecino por los restos de velo; superficie pileica lisa, higrófana, mate, estriada por transparencia; de color marrón rojizo, pardo rojizo, más oscuro en el disco y en algunos basidiomas inmaduros en tiempo húmedo; palideciendo a tonos marrón, marrón castaño pero manteniendo un tono más oscuro en el disco. *Láminas* poco apretadas, con lamélulas, anchas de hasta 6 mm, adnatos libres o adnatos por un diente; de color primero marrón crema, después marrón canela a marrón oscuro; arista entera, crema blanquecino. *Estipite* de 35-75 × 2-4 mm, esbelto, cilíndrico, ligeramente abultado hacia la base, cubierto de finas fibrillas blanquecinas sobre un fondo crema pálido a crema ocre en la mitad inferior, se observan en algunos basidiomas con bandas fugaces de velo; cortina fugaz, blanquecina, marrón en la madurez por el color de las esporas. *Contexto* poco espeso, acuoso, de color marrón rojizo oscuro en el pileo, marrón naranja sucio en el estipite; olor no determinado que recuerda a medicamento, sabor no destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,5) 8,1 × 0,36 (9,0) × (4,7) 5,0 × 0,22 (5,4); Q = (1,4) 1,6 × 0,10 (1,8); elípticas, con verrugas finas y bajas, aisladas, amarillo ocre en agua. Esporada marrón canela. *Pileipellis* tipo tricodermis, con hifas tumbadas más o menos subparalelas, con dos capas: suprapellis de hasta 50 µm de espesor, con hifas de hasta ×8 µm; subpellis de hasta 250 µm, con hifas globosas de hasta ×50 µm, pigmentadas de ocre amarillo, juntas con fibrillas.

Ecología. En verano y otoño en bosques preferentemente de *Picea abies*, en zonas húmedas con briofitos, de tendencia montana y boreal. Distribución. Muy raro, RR. Material estudiado. CANTABRIA, Udias, 240 m, en una pequeña plantación de *Picea abies*, formando colonias numerosas en zona cubierta de briofitos, 4-XII-2021, leg. & det. J.A. Muñoz, rev. J.A. Cadiñanos, BAR2021120405. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius uliginobtus Rob. Henry, BAR2021120405, a. Basidiosporas, b. Pileipellis. Escala barra: a = 10 µm, b = 40 µm.

