




Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 108. 1871

≡ *Agaricus haematopus* Pers., Observationes mycologicae 2: 56. 1800

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de 10-30 mm de diámetro, primero cónico o cónico-acampanado, umbonado, estriado por transparencia; margen delgado, agudo, excedente; superficie pileica, pruinosa, higrófana, un poco lubricado en tiempo húmedo, de color pardo-rosado, marrón claro rosado, con el umbón rojo-vinoso, más tarde pardo-rosado. *Láminas* poco apretadas, ventricosas, escotadas o decurrentes por un diente, de color blanquecinas, blanquecino-rosadas, se manchan de rojizo al frotamiento; arista entera, blanquecina, manchada de rosado en algunos casos. *Estípite* de 40-70 × 1-3 mm, cilíndrico, flexuoso, hueco, liso, de color vinoso, marrón-rojizo o púrpura-marrón, base cubierta de finos pelos erizados blanquecino-grisáceos. *Contexto* escaso, gris-vinoso, olor y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,2-) 8,6 ± 0,67 (-10,0) × (5,0-) 5,7 ± 0,38 (-6,5) µm; Q = (1,3-) 1,6 ± 0,10 (-1,8); elípticas a elíptico cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas. *Basidios* de hasta 35 × 8 µm, tetraspóricos, juntas con fíbulas. *Queilocistidios* de hasta 80 × 18 µm, fusiforme ventrudos, hialinos. *Pileipellis* formada por una capa de hifas tumbadas de hasta ×6µm, recubiertas de gruesas excreciones y protuberancias ramificadas de hasta ×30 µm de altura, pigmentadas de marrón, ligeramente gelificadas, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño, sobre ramas y madera muerta de frondosas, sobre todo *Fagus* y *Quercus*. **Distribución.** Frecuente, C. **Material estudiado.** CANTABRIA, Ruento, 355 m, sobre madera muerta de *Quercus robur*, 21-IX-2024, *leg. & det.*, J.A. Muñoz, BAR2024092103. **Fotografía.** José A. Muñoz Sánchez.



Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm., BAR2024092103, a. Basidiosporas, b. Queilocistidios. Escala barra = 10 µm.

