



***Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 13: 278. 1885**

≡ *Fungus cornucopiae* Paulet, Traité des champignons 2: 2 (index). 1793 [Basion.]


Agaricus cornucopiae (Paulet) Pers., Mycologia Europaea 3: 37. 1828

Pleurotus ostreatus var. *cornucopiae* (Paulet) Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe II: *Pleurotus* Fries: 121. 1935

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* agrupados y cespitosos unidos en la base. *Pileo* de 40-100 mm de diámetro, primero hemisférico, convexo, después embudado; margen delgado, incurvado, liso; superficie pileica lisa, glabra, mate, de color crema-blanquecino, blanco-amarillento, crema-ocráceo. *Láminas* más o menos apretadas, delgadas, anastomosadas, muy decurrentes, al principio casi hasta la base del estípite, crema-blanquecino. *Estípite* de 30-80 × 10-20 mm, cilíndrico, curvado, adelgazado hacia la base, flexuoso, ligeramente excéntrico, crema-blanquecino, típicamente adornado con las láminas que recorren su longitud casi hasta la base. *Contexto* firme, fibrilloso en el estípite, blanquecino; olor fúngico y sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (6,4-) 8,6 ± 0,76 (-10,2) × (3,5-) 4,0 ± 0,45 (-4,7) µm / Q = 2,1 ± 0,10 (-2,2), elípticas o subcilíndricas, lisas, gutuladas, hialinas. *Basidios* de hasta 40 × 8 µm, tetráspóricos, claviformes, juntas con fíbulas. *Cistidios* no observados. *Pileipellis* de tipo trichodermis, con hifas densamente entremezcladas, con elementos terminales de hasta ×4µm, pigmentadas de ocre, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño sobre troncos muertos de frondosas. Distribución. Poco frecuente, R. Material estudiado. CANTABRIA, Saja, 650 m, sobre tronco muerto de *Ulmus* sp., 06-IX-1997, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR1997090601. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Pleurotus cornucopiae (Paulet) Quél., BAR1997090601, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 µm.