




***Hygrophorus poetarum* R. Heim, Bulletin de la Société Mycologique de France 63: 127. 1948**

Caracteres macroscópicos. *Píleo* de 30-130 mm de diámetro, hemisférico, campanulado, después convexo, finalmente plano-convexo o incluso algo deprimido y ligeramente umbonado; margen grueso, involuto, ligeramente excedente; superficie pileica un poco viscosa en tiempo húmedo, sedosa y mate en tiempo seco, blanquecino-anaranjado o crema-rosado, crema-blanquecino hacia la periferia, más oscuro en el disco. *Láminas* espaciadas, gruesas, de adnatas a brevemente decurrentes, anastomosadas, blanquecinas a crema-blanquecino. *Estípote* de 40-100 × 10-20 mm, cilíndrico, pero adelgazándose hacia la base, curvado, fibriloso longitudinalmente, suavemente furfuráceo y exudando gotas acuosas en la parte alta, crema-blanquecino. *Contexto* firme, fibriloso en el estípote, blanquecino, rosado bajo la pileipellis; olor similar a la flor de jacinto, sabor dulce.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (5,7-) 7,2 ± 0,74 (-9,0) × (4,5-) 5,5 ± 0,32 (-6,0) µm / Q = (1,2-) 1,4 ± 0,10, elípticas, subesféricas u ovoidales, lisas, gutuladas, hialinas. *Basidios* de hasta 50 × 10 µm, tetraspóricos, claviformes, juntas con fíbulas. Cistidios ausentes, arista fértil. *Trama laminar* paralela, con elementos subcilíndricos, cortos, de hasta 90 × 15 µm, juntas con fíbulas. *Pileipellis* de tipo ixocutis, con hifas más o menos paralelas y entremezcladas, escasamente fibuladas, con elementos terminales de hasta ×6 µm.

Ecología. En verano y otoño en bosques de *Fagus sylvatica*. Distribución. Muy raro, RR. Material estudiado. CANTABRIA, Soba, Puerto de los Tornos, 940 m, con *Fagus sylvatica*, 20-X-2012, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR2012102044. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Hygrophorus poetarum R. Heim, BAR2012102044, a. basidiosporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.

