



Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman, Fungus, Wageningen 25: 20.1955


≡ *Telamonina casimirii* Velen. [as 'casimiri'], Ceske Houby 3: 464. 1921 [Basion.]

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* de tamaño pequeño y delicado. *Píleo* de 20-40 mm de diámetro, primero convexo umbonado, finalmente extendido y conservando un marcado umbo obtuso con una zona más deprimida alrededor; margen poco enrollado, fisurado, con una banda constituida de restos membranosos de velo blanquecino; superficie pileica mate, rugosa, fibrillosa; de color pardo tabaco o pardo rojizo, que al secarse toma tonos alutáceos. *Láminas* espaciadas, desiguales, sinuosas, ventricosas, con numerosas lamélulas, anchas, escotadas; arista regular o finamente denticulada, más pálida; de color pardo marrón, pardo tabaco con la edad. *Estípote* de hasta 20-60 × 4-6 mm, cilíndrico, sinuoso, atenuado hacia la base, lleno, seco, fibrilloso, blanquecino grisáceo, glauco en la parte alta; con finas bandas fibrosas más oscuras en la mitad inferior; cortina muy fugaz, fibrillosa, blanquecina. *Contexto*. escasa; crema, pardo rojizo en el píleo y corteza del estípote. Sin olor ni sabor destacables. Reacciones químicas: KOH, oliváceo oscuro en la pileipellis, pardo en la carne del estípote.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (10,0) 11,8 ± 0,55 (12,5) × (6,0) 6,5 ± 0,45 (7,0) µm; Q = 1,7 ± 0,1 (1,9); elípticas o ligeramente faseoliformes, apiculadas, con finas verrugas, moderadamente densas. *Pileipellis* dúplex, con cutis filamentosas, no gelificada, conformada por hifas de hasta 8 µm de anchura, cilíndricas, septadas, fibuladas; y con hipodermis subyacente espesa, con hifas subglobosas o botuliformes no muy conspicuas.

Ecología. En verano y otoño, en bosques de coníferas y mixtos, en suelos básicos. **Distribución.** Muy raro. RR. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 710 m, con *Picea abies* y *Chamaecyparis lawsoniana*, sobre calizas duras karstificadas, en suelo descarbonatado, 19-XI-2016, *leg.* & *det.* J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, BAR2016111922. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.

Observaciones: Esta pequeña especie de *Cortinarius* subg. *Telamonina* (Fr.) Trog, más o menos banal, forma parte de un grupo con basidiosporas bastante grandes (> 10 µm).



Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman, BAR2016111922, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 µm.