




***Tricholoma quercetorum* Contu, Micologia e Vegetazione Mediterranea 18 (2): 94. 2004**

Caracteres macroscópicos. Píleo de 40-100 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo, después plano-convexo a extendido, ligeramente umbonado; margen inicialmente involuto, pronto recto, excedente, un poco acanalado en la madurez; superficie pileica separable, lisa, brillante, seca o un poco viscosa en tiempo húmedo, de color pardo-rojizo o pardo castaño, más pálido en tiempo seco. Láminas apretadas, anchas, escotadas, adnatas, con numerosas lamélulas, primero blanquecinas, después crema pálido, con máculas pardo-rojizas en la madurez; arista irregular, concolor. Estípite de 50-120 × 10-18 mm, cilíndrico, lleno, esbelto, sinuoso, adelgazado o radicante hacia la base, superficie cubierta de finas fibrillas pardo-rojizas, de color del píleo o algo más pálido, crema-blanquecino cerca de las láminas. Contexto espeso, fibroso, blanquecino, crema en algunos minutos; olor suave harinoso, más intenso al corte, sabor harinoso.

Caracteres microscópicos. Basidiosporas de $(5,3-) 6,1 \pm 0,68 (-7,0) \times (3,7-) 4,6 \pm 0,34 (-5,3) \mu\text{m}$; $Q = 1,3 \pm 0,10 (-1,5)$; anchamente elípticas, apiculadas, lisas, hialinas, gutuladas, no amiloides. Esporada de color blanco. Basidios de hasta $40 \times 10 \mu\text{m}$, claviformes, tetraspóricos, juntas sin fíbulas. Cistidios no observados. Pileipellis de tipo cutis, formada por hifas tumbadas, más o menos paralelas, cilíndricas, elementos terminales ensanchados, de hasta $\times 8 \mu\text{m}$, con pigmentación incrustante, juntas sin fíbulas.

Ecología. En otoño bosques de *Quercus*, en suelos ácidos, más frecuente en ambiente mediterráneo. Distribución. Poco Común, R. Material estudiado. ARABA Urkabustaiz, 600 m, con *Quercus robur*, en suelo ácido, 03-XI-2012, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2012110361. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Tricholoma quercetorum Contu, BAR201110361, a, Basidios, b. Basidiosporas. Escala barra = 10 μm .

