




***Tricholoma viridifucatum* Bon, Doc. Mycol. 6 (22-23): 185. 1976**

Caracteres macroscópicos. *Píleo* de 40-80 mm de diámetro, primero hemisférico acampanado, después plano-convexo a extendido, ligeramente umbonado; margen incurvado y excedente; superficie pileica separable, lisa, un poco viscosa en tiempo húmedo, cubierta radialmente de fibrillas innatas, de color amarillo-verdoso, ocráceo en el disco. *Láminas* apretadas, ventricosas, anchas, escotadas o adnatas, con numerosas lamélulas, blancas, en ocasiones puede tener tonos amarillo-verdosos; arista aserrada y concolor. *Estípite* de 50-90 × 10-18 mm, cilíndrico, claviforme, lleno, superficie con fibrillas o pequeñas escamas longitudinales concoloras u ocráceas, de color amarillo-verdoso. *Contexto* espeso, fibroso, blanquecino; olor y sabor suave ligeramente harinoso.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (5,5-) 6,2 ± 0,68 (-7,0) × (4,0-) 4,5 ± 0,34 (-5,0) µm; Q = 1,4 ± 0,10; elipsoidales a elipsoides, apiculadas, lisas, hialinas, gutuladas, no amiloides. Esporada de color blanco. *Basidios* de hasta 50 × 10 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fíbulas. *Cistidios* no observados. *Pileipellis* de tipo cutis, con elementos terminales de cilíndricos a claviformes de hasta ×9 µm, hialinas, con pigmento incrustante.

Ecología. En otoño en bosques de frondosas, sobre todo con *Quercus*, en suelos ácidos. Distribución. Muy raro, RR. Material estudiado. BURGOS, Valle de Mena, 480 m, con *Quercus robur* y *Castanea sativa*, en suelo ácido, 26-VII-1997, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR1997072606. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Tricholoma viridifucatum Bon, BAR1997072606, a. Basidiosporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.

