




Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici*: 287. 1838

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de 20-60 mm, algo carnoso, pero frágil; de hemisférico a campanulado, después convexo, provisto de un pequeño umbón obtuso, margen al principio incurvado, pronto recto, un poco excedente, superficie pileica algo viscosa en tiempo húmedo, higrófana, de color gris violáceo, gris rojizo, marrón rojizo, pálido en tiempo seco, recubierto de fibrillas floconosas. *Láminas* prietas a algo separadas, escotado-adnatas, anchas, sinuosas, de color inicialmente violáceo claro, rojizo canela en la madurez; arista irregular, blanquecina. *Estípite* de 40-80 × 5-10 mm, cilíndrico o claviforme, hueco, fibrilloso, del color del pileo o algo más claro, decorado con manchas marrón rojizo por debajo de la cortina, cortina fugaz, ferruginosa. *Contexto* espeso, firme, ocráceo, olor herbáceo o terroso ligero, sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,0) 7,7 ± 0,55 (8,5) × (5,0) 6,0 ± 0,53 (6,9) µm; Q = 1,2 ± 0,1 (1,4); 7,0-8,5 × 5,0-6,5 µm / Q = 1,2-1,4, subglobosas, a veces solo anchamente elipsoidales; ornamentación densa, fina-media, baja, algo rugosa en la mitad distal, amarillo leonado claro con KOH al 2%. Esporada pardo-ferruginosa. *Pileipellis* filamentosas, no gelificadas, con hifas más o menos paralelas, de hasta ×10 µm, tumbadas, cilíndricas, con septos distantes, fibuladas, con pigmento intracelular ocre amarillento, juntas con fibulas.

Ecología. En verano y otoño en bosques de coníferas o mixtos, especialmente bajo *Picea abies*, también con *Larix sp.* y *Pinus sp.* Distribución. Poco frecuente. R. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 750 m, con *Picea abies*, en suelo ácido, 22-X-2016, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Cadiñanos, BAR2016102228. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.

Observaciones: Este taxón pertenece a *Cortinarius* sect. *Anomali* Konrad & Maubl. y se caracteriza por el pileo de tono rojizo vinoso, más grisáceo y micáceo al secarse (es bastante higrófono), velo del mismo color y a menudo crece bajo coníferas, pero también con frondosas. Basidiosporas subglobulosas, a veces solo anchamente obovoides; ornamentación densa, fina-media, baja, algo rugosa en la mitad distal. R.



Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr., BAR2016102228, a. basidiosporas. Escala barra = 10 µm.