



Cortinarius transiens (Melot) Soop, Agarica 10/11(19-20): 35. 1990


≡ *Cortinarius salor* subsp. *transiens* Melot, Doc. Mycol. 20(77): 96. 1989 [basion.]
– *Cortinarius largodelibutus* Rob. Henry, Bull. Trimestiel Soc. Mycol. France 79(3): 300. 1963. nom. inval.

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* dispersos o gregarios, de tamaño pequeño o medianos y aspecto grácil. *Pileo* de hasta 50-53 mm; algo carnoso, elástico, no frágil; sub-hemisférico con margen muy incurvado, después convexo a plano-convexo pero manteniendo el margen enrollado; superficie pileica separable hasta el disco (unos 2/3), no muy tenaz, bastante y duraderamente viscosa y pegajosa, no amarga, lisa, con fibrillas innatas poco conspicuas hacia el margen, a veces con grumos de viscosidad. Al principio de color beis miel suave e irregular en el disco, con tono gris-violáceo lívido en el margen, a veces con una orla de velo blanquecino en el mismo margen en algunos ejemplares, después beis más o menos amarillento o leonado con el margen todavía lívido, crema beis, manteniendo a veces los tonos grises. *Láminas* separadas; algo anchas de hasta 7 mm; escotadas o un poco uncinadas; al principio de color liláceo azulado tenue (sobre todo en la arista), más café con leche fuera de la arista, al final café con leche arcilla; arista, al principio, más clara, blanco lila o azulada, de inicio entera, pero erodada o irregularmente aserrada en los ejemplares desarrollados, blanquecina luego concolor; lisas. *Estípites* largo: hasta 40-85 × 10-14 mm; primero con la médula blanda, cottonosa, después hueco, firme pero frágil; claviforme pero casi siempre un poco fusoide-radicante en el extremo basal; parte supracortinal furfurácea, cortina mucosa (no aracnoide o fibrosa), escasa, blanca, pero con velo también mucoso que deja burletes de color beis lívido a beis amarillento, más abundante hacia la base, en el estípites, resto liso; color blanco azulado, más permanente en la parte superior y más beis sucio (por velo) o blanquecino hacia abajo, cordones miceliares blancos. *Contexto* relativamente abundante, firme, algo elástico, pero quebradizo sobre todo en el estípites; blanquecino, suavemente beis en el pileo y en la base del estípites, azulado violáceo en la mitad superior del estípites, sobre todo y de forma más duradera en el córtex; sabor poco apreciable, no amargo; olor suave entre dulzón y de caucho, el típico del grupo *Delibuti*. KOH: gris pálido, nula o subnula en contexto y superficies. Tintura de guayaco: nula.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,4) 8,2 ± 0,46 (9,1) × (6,4) 7,2 ± 0,30 (7,9) µm; Q = (1,0) 1,2 ± 0,1; subesféricas o subglobulosas; ornamentación densa, media-gruesa, algo rugosa. *Pileipellis* no observada.

Ecología. En verano y otoño, bajo *Picea abies*. Distribución. Muy raro. RR. Material estudiado, BIZKAIA, Zeanuri, Atxurdin, 307WN2163, 700 m, *Picea abies*, 05-X-2019, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, det. J.A. Cadiñanos, ARANGU-Cort-19100501. Fotografía: José A. Cadiñanos.

Observaciones: Quizás sea ésta la única cita de este taxón, algo controvertido, en la península ibérica. La sinonimia con *C. largodelibutus* Rob. Henry nos resulta evidente y también la asume SOOP (1990: 35), pero este taxón, descrito mucho antes por HENRY (1963: 300), fue publicado de forma inválida según INDEX FUNGORUM (2023).



Cortinarius transiens (Melot) Soop, ARANGU-Cort-1910501, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 µm.