



***Rimbachia bryophila* (Pers.) Redhead, Canad. J. Bot. 62 (5): 878. 1984**

≡ *Agaricus bryophilus* Pers., *Observationes mycologicae* 1: 8, t. 3:1. 1796


Leptoglossum bryophilum (Pers.: Fr.) Rick., *Blätterpilze*: 6. 1910

Mniopetalum bryophilum (Pers.: Fr.) DOnk, *Persoonia* 2 : 335. 1962.

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* pileados, sésil. *Píleo* de hasta 5 mm de diámetro, dorsificada, semicircular o circular, higrófano, no es-triado, liso, a veces u poco glabro, de color blanco. *Himenóforo* débil-mente venoso con aspecto de pequeñas láminas, blanco; arista entera y concolor. Estípite ausente. *Contexto* muy delgado, blanquecino, sabor y sabor poco apreciable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(6,4-7,5 \pm 0,64 (-8,5) \times (5,0-5,7 \pm 0,38 (-6,5) \times (3,5-4,2 \pm 0,43 (-5,1))$; $Q = 1,3 \pm 0,1 (-1,5)$; de globosas a subglobosas, lisas, con apícula prominente. Esporada de color blanco. *Basidios* hasta $19 \times 8 \mu\text{m}$, claviformes, tetraspóricos, juntas con fíbulas. *Queilocistidios* no observados. *Pileipellis* formando por un cutis, de hifas más o menos paralelas, de hasta $\times 3 \mu\text{m}$, con pig-mento intracelular, juntas con fíbulas.

Ecología. En verano y otoño parasitando musgos, especialmente del género *Mnium* sp. **Distribución.** Muy raro, RR. Material estudiado, CANTABRIA, Valdáliga, 220m, parasitando musgos (*Thuidium tamaris-cinum*). 10-VIII-2025, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2025081002. Foto-grafía. José A. Muñoz Sánchez.



Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead, BAR2025081002, a. Basi-diosporas, b. Basidios. Escala barra = 10 μm .

