



***Thelephora anthocephala* (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 535. 1838**


≡ *Clavaria anthocephala* Bull., Herbar de la France 10 (109-120): t. 452:1. 1790 [Basion.]

Thelephora palmata var. *anthocephala* (Bull.) Fr., Systema Mycologicum 1: 433. 1821

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* anuales, ramificados y coraloides, de 30-60 × 20-50 mm. Ramificaciones son dicótomas o policótomas, en V, ramas cilíndricas o aplanadas en el ápice e incluso en espátula, de color primero blanquecino sobre todo en la parte alta, grises o pardo-grisáceas. *Himenóforo* situado en las ramificaciones, anfigeno, liso, blanquecino, grisáceo o pardo-grisáceo. Estípites rudimentario, de 8-15 mm, liso, concolor con las ramas. *Contexto* firme, coriáceo, incluso elástico; olor y sabor nada destacables.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (7,5-) 8,2 ± 0,62 (-9,1) × (4,0-) 4,5 ± 0,37 (-5,1); Q = 1,8 ± 0,1; elipsoides o irregulares, con espinas cónicas, pardas. *Basidios* de hasta 60 × 9 µm, claviformes, tetraspóricos, juntas con fibulas. *Sistema de hifas* monomítico: hifas generativas del contexto subparalelas, con pared delgada, de hasta ×5 µm, juntas con fibulas.

Ecología. En verano y otoño, en bosques de planifolios, sobre todo *Quercus* sp., Distribución. Poco frecuente, R. Material estudiado. CANTABRIA, Valdáliga, 320 m, con *Quercus robur* y *Corylus avellana*, 10-VI-II-2025, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2025081002. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Thelephora anthocephala (Bull.) Fr., BAR2025081002, a. Basidiosporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.

