



***Crepidotus calolepis* (Fr.) P. Karst., Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 32: 414. 1879**


≡ *Agaricus calolepis* Fr., Öfvers. Kongl. Vetensk.-Akad. Förh. 30 (5): 5. 1873 [Basion.]

Crepidotus mollis subsp. *calolepis* (Fr.) Nordstein, Syn. Fung. 2: 67. 1990

Caracteres macroscópicos. *Píleo* de 15-55 mm de diámetro, sésil, semicircular o flabeliforme, adherido al sustrato lateralmente; margen primero inflexo, agudo, ondulado; superficie pileica seca, finamente escamosa con fibrillas pardas sobre fondo crema pálido o amarillo-crema. *Láminas* bastante apretadas, adnatas, delgadas; de color crema amarillo al principio posteriormente ocráceo. *Estípites* ausente. *Contexto* delgado, flexible, blanquecino o un poco ocráceo, sabor un poco amarescente sin olor particular.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(7,0-)\ 8,2 \pm 0,50\ (-8,8) \times (5,0-)\ 5,6 \pm 0,35\ (-6,2)\ \mu\text{m}$ / $Q = 1,5 \pm 0,11$; de elipsoides a amigdaliformes, apiculadas, lisas, gutuladas, ocre-marrón en agua. Esporada de color ocre canela. *Basidios* de $22-30 \times 6-8\ \mu\text{m}$, claviformes, tetraspóricos, juntas sin fibulas. *Queilocistidios* abundantes de $40-65 \times 3-8\ \mu\text{m}$, cilíndricos, sinuosos, lageniformes, clavados, incluso subcapitados. *Pileipellis* de tipo cutis, con hifas subparalelas, septadas y estranguladas en los septos, con las terminaciones en general adelgazadas, de $7-10\ \mu\text{m}$ de anchura con pigmento parietal incrustante de aspecto cebrado, de color marrón.

Ecología. En verano y otoño, sobre ramas muertas de frondosas. Distribución. Muy raro. RR. Material estudiado. CANTABRIA, Valdálga, 50m, sobre madera muerta de *Quercus robur*, 13-IX-2025, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2025091301. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst., BAR2025091301, a. Basidiosporas, b y c. Pileipellis. Escala barra = 10 μm .