




≡ *Lepidella codinae* Maire, Publ. Junta Ci. Nat. Barcelona Sèr. Botànica.
15 (2): 85. 1933 [Basion.]

Aspidella codinae (Maire) Vizzini & Contu, in Vizzini, Contu, Ercole & Voyron, Micol. Veg. Medit. 27(Suppl. 2): 82 (2012)]

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de hasta 50-150 mm de diámetro, primero hemisférico, después convexo y finalmente plano convexo; margen obtuso, regular y entero; superficie pileica lisa, separable, mate, desbordante en el margen, de color blanco o crema blanquecino, cubierto de abundantes y gruesas restos de velo general a modo de escamas floconosas, más o menos piramidales, apretadas en el centro, adnatas, de color crema-pálido, marrones en la maduración. *Láminas* libres, anchas, apretadas, de color blanco o crema-blanquecino. *Estipite* de hasta 60-150 × 15-35 mm, cilíndrico, adelgazado hacia la base e incluso algo radicante, blanco o blanco crema, ligeramente estriado por encima del anillo, cubierto de numerosas y gruesas escamas en la parte inferior; con anillo membranoso, persistente, tenaz, que se rompe en amplios y groseros fragmentos colgantes, dispuestos en bandas concéntricas, de color primero crema-pálido, marrones en la madurez. *Contexto* espeso, firme, blanco; olor ligero a miel, un poco desagradable en la madurez, sabor poco remarcable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de 9,5-14,5 × 8,5—100 µm; Q = 1,2-1,5; elípticas, raramente subglobulosas, lisas, hialinas, no amiloides. Esporada blanca. *Elementos del velo* formado mayoritariamente por hifas filamentosas, en gran parte fusiformes, algunas elípticas o subfusiformes, de hasta 250 × 40 µm con algunos elementos terminales filamentosos de hasta 8 µm.

Ecología. Especie termófila, en primavera, en suelos arenosos, básicos, bajo frondosas (*Quercus ilex*). Distribución. Muy raro y localizado. Material estudiado. MADRID, Pozuelo de Alarcón, 650m, en el borde de un camino con *Quercus ilex* y *Pinus pinaster*, 16-V-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016051601. Fotografía. Jose A. Muñoz Sánchez.



Amanita codinae (Maire) Bertault, BAR2016051601, a. Basidiosporas, b. Basidios, c. Elementos del velo. Escala micro: a y b = 10 μ m, c = 20 μ m.