



***Camarophyllus flavipes* (Britzelm.) Cléménçon, Beih. Z. Mykol. 4: 55. 1982**

≡ *Hygrophorus flavipes* Britzelm., Hymenomyc. Südbayern 8: 10. 1891 [basónimo]


Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Bon, Doc. Mycol. 14(53): 6. 1984

Cuphophyllus flavipes (Britzelm.) Bon, Doc. Mycol. 14(56): 11. 1985 [1984]

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de 20-50 mm de diámetro, cónico-convexo, después convexo, finalmente plano-convexo incluso algo deprimido, ligeramente umbonado; margen involuto, suavemente estriado por transparencia; superficie pileica un poco lubricada en tiempo húmedo, lisa, higrófana, de color lilá-violáceo oscuro, gris-marrón, violáceo-grisáceo, palideciendo al secarse. *Láminas* arqueadas, sinuosas, decurrentes, intervenadas, grises, gris-violáceo, gris-amarillento hacia el margen. *Estípites* de 30-60 × 4-8 mm, cilíndrico, curvado, fistuloso, atenuado hacia la base, superficie longitudinalmente fibriloso, concolor al pileo o algo más pálido, de color amarillo-citrino hacia la base. *Contexto* firme, fibrilloso, higrófano, blanquecino, amarillo citrino en la base; olor y sabor poco destacables.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (5,5-) 7,0 ± 0,74 (-8,0) × (4,5-) 5,5 ± 0,48 (-6,2) µm / Q = (1,0-) 1,2 ± 0,10 (-1,4), subglobosas o lacrimoides, en ocasiones elipsoides, lisas, gutuladas, hialinas. *Basidios* de hasta 55 × 9 µm, tetráporicos, claviformes, juntas con fíbulas. *Cistidios* ausentes, arista fértil. *Trama laminar* entrelazada, con elementos subelípticos o subcilíndricos, cortos, de hasta 90 × 15 µm, juntas con fíbulas. *Pileipellis* inicialmente de tipo ixocutis a ixotrichodermis, con una capa gelatinosa de hasta 100 µm de espesor, con elementos cilíndricos, con terminaciones claviformes, de hasta ×5 µm, hifas de la hipocutis subcilíndricas, juntas con fíbulas.

Ecología. En otoño en prados y pastos naturales con presencia de briofitos, en suelos neutros. Distribución. Muy raro y localizado, RR. Material estudiado. BLZKAIA, Gorliz, 150 m, en un prado natural, 20-XI-2010, *leg. & det.* J.A. Muñoz. BAR2010112004. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Camarophyllus flavipes (Britzelm.) Cléménçon, BAR2010112004, a. Basidiosporas, b. Basidios. Escala = 10 µm.

