



Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä, Karstenia 24: 25. 1984

≡ *Xanthochrous tamaricis* Pat., Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France 20: 51. 1904 [basónimo]

Polyporus tamaricis (Pat.) Sacc. & D. Sacc., Syll. Fung. 17: 111. 1905


Xanthochrous rheades subsp. *tamaricis* (Pat.) Bourdot & Galzin, Bull. Soc. Mycol. France 41 (1-2): 202. 1925

Inonotus tamaricis (Pat.) Maire, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 45: 89. 1938

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* anuales, imbricados o aislados, divididos o semicirculares, unidos lateralmente al sustrato. *Pileo* de hasta 150 mm de anchura y 60 mm de espesor, fijado lateralmente al sustrato por una amplia zona; margen obtuso, redondeado, pubescente, después glabro; superficie pileica hispida, erizada de pequeños pelillos, algo zonada y surcada concéntricamente, de color ocre-naranja, pardo, pardo-rojizo finalmente negruzco. *Himenóforo* formado por tubos, irregulares, monoestratificados, cortos de hasta 4 mm de espesor, de color pardo-amarillento o pardo oscuro, poros muy apretados, redondos o poligonales, de color amarillo-oliváceo, pardo-grisáceo, pardo-negruzco en la madurez. *Contexto* carnoso, suberoso, fibroso, espeso, un poco zonado, pardo-leonado a ferruginoso; olor desagradable, sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(6,5-) 7,4 \pm 0,62 (-8,5) \times (5,0-) 5,7 \pm 0,38 (-6,5)$; $Q = 1,3 \pm 0,1$; subglobosas o anchamente elipsoidales, lisas, de pared espesa, pardas. *Basidios* de $16-22 \times 7-10 \mu\text{m}$, claviformes, tetraspóricos, juntas sin fibulas. Sistema de hifas monomítico. *Hifas generativas* del contexto de hasta $\times 10 \mu\text{m}$, subparalelas, hialinas, septadas, con pared delgada o moderada, juntas sin fibulas, hialinas o amarillentas.

Ecología. Especie parásita que provoca podredumbre blanca, termófila, desde principios de verano a otoño, sobre viejos troncos de *Tamarix gallica* sobre todo en parques y jardines. Distribución Poco frecuente, R. Material estudiado. CANTABRIA, Santander, Paseo marítimo, 12 m, sobre viejo tronco vivo de *Tamarix gallica*, 26-VIII-2025, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR2025082601. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä, BAR2025082601, a. Basidiosporas, b. Basidios. c. Hifas generativas. Escala barra = 10 μm .