



Pholiota gummosa (Lasch) Singer, Lilloa 22: 517. 1951

≡ *Agaricus gummosus* Lasch, Linnaea 3: 405. 1828 [Basion.]

Flammula gummosa (Lasch) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 82. 1871

Dryophila gummosa (Lasch) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 71 1886

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* agaricoides, de tamaño medio. *Pileo* de 30-80 mm, primero hemisférico, después convexo a plano convexo, en algunos casos con umbón central; margen primero involuto después recto, ondulado, con restos de velo blancos o amarillentos; superficie pileica cubierta de abundantes fibrillas y pequeñas escamas pardo-amarillentas, viscosa en tiempo húmedo, no higrofana, de color crema-amarillento, amarillento u ocre-amarillento, con reflejos oliváceos. *Láminas* apretadas, estrechas, adnatas o un poco decurrentes, ventricosas, de color primero crema, después pardo-amarillentas o con reflejos oliváceos; arista laminas blanquecina, irregular y algodonoso. *Estípite* de 30-100 × 5-10 mm, cilíndrico, un poco abultado hacia la base, pruinoso en la parte superior, cubierto de fibrillas o pequeñas escamas blanquecinas o cremas, pardo-amarillentas en la madurez, sobre fondo pardo-amarillentos; provisto de anillo persistente al principio. *Contexto* escaso, blanquecino; olor y sabor no destacable.


Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(5,5-), 6,8 \pm 0,76 (-8,1) \times (3,5-), 4,0 \pm 0,35 (-4,5) \mu\text{m}$ / $Q = (1,3-), 1,6 \pm 0,10 (2,2)$, elipsoides, oblongas incluso faseoliformes, con poro germinativo conspicuo, apiculadas, pared moderada, gutuladas, de pardo-marrón. Esporada pardo-marrón. *Basidios* de $15-25 \times 5-8 \mu\text{m}$, tetráspóricos, claviformes o cilíndricos, juntas con fíbulas. *Queilocistidios* de dos tipos: a) queileoleptocistidios, abundantes, de $25-70 \times 6-12 \mu\text{m}$, cilíndricos o lageniformes, con el ápice subcapitado; b) queilocrisocistidios, escasos, de $25-60 \times 7-15 \mu\text{m}$, claviformes, utriformes, mucronados. *Pleurocistidios* de tipo crisocistidios de $25-60 \times 7-15 \mu\text{m}$, claviformes, utriformes o mucronados. *Pileipellis* de tipo ixocutis, con hifas terminales más o menos tumbadas y entremezcladas, arículos terminales cilíndricos $\times 2-6 \mu\text{m}$, juntas sin fíbulas.

Ecología. En otoño en bosques de frondosas, en bordes de caminos, sobre restos leñosos enterrados, gregario o aislado. Distribución. Frecuente, C. Material estudiado. CANTABRIA, Valdáliga, 125 m, en borde de camino herboso, sobre restos leñosos, 19-IX-2025, *leg. & det.* J.A. Muñoz. BAR 2025091902. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.

Citar como: MUÑOZ, J. A. (2025). *Pholiota gummosa* (Lasch) Singer, micológica-barakaldo.org [en línea]. Fichas Micológicas, 978 (Actualizada el 09-XI-2025). ISSN 2660-633X. [consultado el xx/xx/xxx] <https://micologica-barakaldo.org/Pholiota-gummosa/>



Queda prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión de la misma por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de la Sociedad Micológica Barakaldo. Las fotografías son propiedad de sus autores.



Pholiota gummosa (Lasch) Singer, BAR2025091902, a. Basidiosporas, b. Queilocistidios. Escala barra = 10 μm .