




***Entoloma prunuloides* (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 117. 1872**

≡ *Agaricus prunuloides* Fr., Systema Mycologicum 1: 198. 1821 [basónimo]

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* de tamaño medio a grande, aislados y en pequeños grupos. *Pileo* de 30-90 mm de diámetro, primero acampanado, cónico campanulado después plano convexo a extendido, pero manteniendo un umbón bajo, margen un poco involuto, después recto, delgado; superficie pileica, glabra, radialmente fibriloso, brillante y untosa en tiempo húmedo, de color crema, crema-blanquecino, crema-grisáceo, ocre-grisáceo, más oscuro en el disco, blanquecino en tiempo seco. *Láminas* moderadamente apretadas, distantes, emarginadas, ventricosas, de color primero blanquecino, rosas en la madurez. *Estipite* de 30-80 x 4-12 mm, cilíndrico, base ligeramente atenuada, glabro, fibriloso estriado, blanquecino, a menudo con tonos crema amarillentos. *Contexto* firme, blanquecino, olor y sabor harinoso.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(6,0-) 7,2 \pm 0,68$ (-8,7) × $(6,1-) 7,1 \pm 0,32$ (-6,4) μm; Q = $1,1 \pm 0,10$; isodiamétricas, con 5-7 ángulos vistas de perfil. Basidios tetraspóricos, juntas con fíbulas. *Queilocistidios* ausentes. *Pileipellis* formada por un ixocutis de hifas cilíndricas, entremezcladas, estrechas de hasta x8 μm, con pigmento intracelular, juntas con fíbulas.

Ecología. Sobre todo, en primavera y más raramente en otoño, en lugares herbosos, praderas y pastizales, en suelos básicos. Distribución. muy raro. RR. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 710m, con *Chamaecyparis lawsoniana*, en suelo cubierto de briofitos, en suelo calcáreo, 27-IX-2024, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2024092713. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Entoloma prunuloides (Fr.) Quél., BAR2024092713, a. esporas, b. Pileipellis. Escala barra: a = 10 μm, b = 20 μm.

